

HERBICIDA
RANGO FULL

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3540

RANGO FULL, es un herbicida sistémico, no selectivo y de post-emergencia recomendado para el control las malezas descritas en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN:

Glifosato-potasio (*)	66,2% p/v (662 g/l)
Coformulantes c.s.p.	100% p/v (1 l)

(*) Sal potásica de N-(fosfonometil)glicina (54% p/v (540 g/l) de equivalente ácido de glifosato)

<< LEA ATENTAMENTE ESTE FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Lote N°:

Fabricado por:

ANASAC CHILE S.A
Camino Noviciado Norte Lote 73-B
LAMPA - CHILE

GLEBA S.A.
Avda. 520 y Ruta Provincial 36 (1903)
Melchor Romero, La Plata
Buenos Aires Argentina

Distribuido por:

anasac
ANASAC CHILE S.A
Almirante Pastene 300 - Providencia
SANTIAGO - CHILE

Contenido Neto:

Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd.
Town South Donghua District, Longyou County,
Zhejiang, China

Fecha Vencimiento:

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

RANGO FULL, es un herbicida sistémico, cuyo ingrediente activo Glifosato.potasio pertenece al grupo químico de los organofosfonatos. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la manipulación del concentrado líquido usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek®, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. Durante una aplicación vía aérea se recomienda que el piloto use ropa de protección adecuada y se asegure de mantener alejadas del área de aplicación a personas y animales. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 10 Km/hora, usar pantalla protectora o boquilla antideriva en caso de ser necesario. Evitar aplicar con temperaturas superiores a 30°C, idealmente temprano en la mañana o al atardecer, evitando el secado muy rápido de la pulverización. Evitar aplicar sobre follaje mojado o con tierra. Considerar 3 a 4 horas libres de precipitaciones después de la aplicación. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

RANGO FULL, es prácticamente no tóxico para microcrustáceos acuáticos, peces y aves. Virtualmente no tóxico para abejas.

PARA APLICACIONES AÉREAS SE DEBEN RESPETAR LAS DISPOSICIONES QUE HAYA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>

<< REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>

<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>

<< NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>

Instrucciones Triple Lavado: para el triple lavado se recomienda llenar el envase hasta ¼ de su volumen con agua, cerrar y agitar durante 30 segundos, abrir el envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador, repetir al menos dos veces más hasta que el agua de desecho sea clara.

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: En caso de intoxicación realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios:

En caso de contacto cutáneo: retirar la ropa contaminada y lavar la zona afectada con agua fría y jabón. **En caso de contacto ocular:** si el producto ingresó a los ojos lavarlos con agua fría, por al menos 15 minutos. **En caso de inhalación:** trasladar al afectado al aire fresco, tenderlo y abrigarlo. **En caso de ingestión:** dar a beber 2 tazas de agua y NO PROVOCAR EL VÓMITO. En todos los casos trasladar en forma inmediata a un centro asistencial.

Síntomas de Intoxicación: Irritación de ojos y sistema gastrointestinal. Dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea.

<< EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfonos de Emergencia:
(02) 2777 1994 (CORPORACION RITA); (02) 2486 9000 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve **RANGO FULL**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave.

No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.



CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO

RANGO FULL, es un herbicida sistémico, no selectivo y de post-emergencia recomendado para el control de las malezas descritas a continuación.

Plantaciones Frutales: Almendro, Damasco, Cerezo, Ciruelo, Duraznero, Nectarino, Manzano, Membrillo, Nogal, Olivo, Palto, Peral, Vid, Kiwi, Limonero, Lima, Naranja, Pomelo, Mandarino, Clementino, Tangerina, Tangelo, Níspero, Caqui, Frambuesa, Arándano, Mora, Zarparrilla, Frutilla, Cranberries, Grosellas, Parronales y Viñas. **Plantaciones forestales, Cero y Mínima Labranza, Barbechos químicos, Regeneración de praderas, Preparación de sitios.**

Por ser muy amplio el espectro de malezas que controla **Rango Full** se citan solo las principales.

Malezas Perennes:

Nombre común (Nombre científico)	Dosis L/ha
Pasto quila (<i>Agrotis sp</i>) Pasto cebolla (<i>Arrhenatherum elatius var. Bulbosus</i>)	1,5 - 3,0
Maicillo (<i>Sorghum halepense</i>) Falso té (<i>Bidens aurea</i>) Siete venas (<i>Plantago lanceolata</i>)	2,0 - 4,0
Galega (<i>Galega officinalis</i>) Junquillo (<i>Juncos sp</i>)	2,6 - 6,0
Chépica gigante (<i>Paspalum dilatatum</i>)	2,6 - 4,0
Chufa (<i>Cyperus sp</i>)	3,5 - 6,0
Pasto bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>)	4,0 - 6,0
Correhuela (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4,0 - 8,0

Malezas Anuales:

Nombre común (Nombre científico)	Dosis L/ha
Ballica (<i>Lolium spp</i>) Pega-pega (<i>Setaria spp.</i>) Pasto del perro (<i>Bromus spp</i>) Cola de zorro (<i>Cynosorus echinatus</i>)	1,5 - 3,0
Hualcacho (<i>Echinochloa spp</i>) Bledo (<i>Amaranthus spp</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Rábano (<i>Raphanus sativus</i>) Quinguilla (<i>Chenopodium spp</i>)	2,0 - 3,0
Pata de gallina (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	1,0 - 2,5
Enredadera (<i>Bilderdykia convolvulus</i>)	2,0 - 4,0

Malezas Arbustivas:

Nombre común (Nombre científico)	Dosis L/ha
Ulex (<i>Ulex europaeus</i>) Zarzamora (<i>Rubus spp</i>) Maqui (<i>Aristotelia chilensis</i>) Bacharis (<i>Baccharis sp.</i>) Mayo (<i>Sophora macrocarpa</i>) Boldo (<i>Peumus boldus</i>) Litre (<i>Litrea caustica</i>) Roble (<i>Nothofagus obliqua</i>) Quillay (<i>Quillaza saponaria</i>) Fuinque (<i>Lomatia ferruginea</i>)	4,0 - 10,0
Control de tocones de especies arbustivas y arbóreas tales como Retamillo, Aromo, Maqui, Zarzamora, Palqui, Rosa mosqueta, Ulex, Boldo, Arrayan, Bollen, Litre, Olivillo, Peumo, Quila, Quillay, Roble, Butro, Pino Eucalipto	Aplicar en dosis de 7-14 % hasta 24 horas después de haber realizado el corte y con la precaución de cubrir bien el cambium.

Barbecho químico:

Dosis	Observaciones
3 - 4 Litros	Aplicar y sembrar inmediatamente

Carencia: No corresponde

Realizar como máximo 6 aplicaciones por temporada, con un intervalo mínimo de 45 días entre una aplicación y otra.

Instrucciones de uso:

- Para control de Malezas arbustivas se puede mezclar con Ajax 50 WP.
- En barbecho químico se puede mezclar con Ajax 50 WP aplicando 60 a 90 días previo a la siembra.
- Las aplicaciones pueden realizarse con equipos pulverizadores de mochila, equipos terrestres o aéreos.
- Rango Full puede ser aplicado vía aérea en barbechos químicos y preparación de sitios forestales.
- Para aplicaciones aéreas, aplicar con volúmenes de agua de 20-40 L/ha. Para obtener mejores resultados la concentración del producto en el agua no debe ser menor al 1%.
- Para aplicaciones con equipo de mochila se debe preparar una solución de 1 a 2 L de Rango Full en 100 Lt de agua y aplicar mojando bien el follaje, pero sin que llegue a gotear.
- En aplicaciones de cobertura total, con equipos pulverizadores terrestres, se debe usar la dosis recomendada diluida en 80 a 120 L/ha.
- Aplicar selectivamente sobre las malezas, en época de mayor susceptibilidad.
- Usar dosis menor con malezas más sensibles a glifosato y en sus primeros estados de desarrollo y dosis mayor con malezas de menor susceptibilidad a glifosato y que se encuentren con un mayor estado de desarrollo.
- Rango Full es un producto sistémico, por lo que actúa solo sobre malezas presentes al momento de la aplicación.
- Los efectos sobre las malezas pueden tardar en manifestarse. Esto va a depender de la temperatura, dosis aplicada y estado de la maleza al momento de la aplicación.
- No segar o cortar la maleza antes o después del tratamiento.
- No aplicar sobre malezas estresadas.
- Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 10 Km/hora, usar pantalla protectora o boquilla antideriva en caso de ser necesario
- Evitar aplicar con temperaturas superiores a 30°C, idealmente temprano en la mañana o al atardecer, evitando el secado muy rápido de la pulverización.
- Evitar aplicar sobre follaje mojado o con tierra.
- Considerar 3 a 4 horas libres de precipitaciones después de la aplicación.

Preparación de la mezcla: Para la preparación de la mezcla es necesario llenar el estanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua y agregar la cantidad necesaria de Rango Full. Luego completar con agua hasta completar el volumen necesario, manteniendo agitación constante.

Compatibilidad: Rango Full es compatible con otros herbicidas residuales o sistémicos, en caso de duda verificar la compatibilidad de la mezcla.

Incompatibilidad: Rango Full es incompatible con formulaciones de MCPA. En el caso de mezclas con formulaciones de 2,4 D verifique la compatibilidad física de la mezcla antes de aplicar.

Fitotoxicidad: Rango Full es fitotóxico con cualquier tejido verde que entre en contacto con el.

Tiempo de reingreso: 4 horas para ingresar al sector tratado para personas sin equipo de protección personal y animales.

Clasificación HRAC: Grupo G; inhibición de EPSP sintetasa.



CUIDADO

