

HERBICIDA

TANGO 24 EC

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Autorizado del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3488

TANGO 24 EC, es un herbicida de contacto, residual y de aplicación en pre y postemergencia de las malezas descritas en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICION:

* Oxifluorfenol	24% p/v (240g/l)
Cofomulantes c.s.p	100% p/v (1 l)
* 2 - cloro - α , α - trifluoro - p - tolil - 3 - etoxi - 4 - nitrofenil éter.	

<< LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Distribuido por:

ANASAC CHILE S.A
Almirante Pastene 300 - Providencia
SANTIAGO – CHILE

Lote N°:
Contenido Neto:

Fecha Vencimiento:

Fabricado por:
ANASAC CHILE S.A
Camino Noviciado Norte Lote 73-B
LAMPA – CHILE
**ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC
CROP SCIENCE CO., LTD.**
Town South Donghua District, Longyou
County, Zhejiang, China ZIP: 324400

INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

TANGO 24 EC, herbicida cuyo ingrediente activo Oxifluorfenol pertenece al grupo químico de los Difenil éter. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la manipulación del concentrado líquido usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección, traje impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la manipulación y la aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

TANGO 24 EC, es moderadamente tóxico para peces y microcrustáceos acuáticos, prácticamente no tóxico para aves y virtualmente no tóxico para abejas.

<<MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >> <<NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >> <<NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >> <<REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >> <<LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

Triple Lavado: para el triple lavado se recomienda llenar el envase hasta $\frac{1}{4}$ de su volumen con agua, cerrar y agitar durante 30 segundos. Abrir el envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador, repetir al menos dos veces más hasta que el agua de desecho sea clara

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios: **En caso de contacto cutáneo:** retirar la ropa y zapatos contaminados. Limpiar bien los restos del producto y luego lavar la piel con agua fría y jabón. **En caso de contacto ocular:** lavar inmediatamente los ojos con agua tibia, durante 10 minutos. Mantener en lo posible los párpados abiertos. **En caso de inhalación:** retirar al afectado del área de exposición y llevarlo al aire libre, si no respira dar respiración artificial. Mantenerlo en lugar oscuro, abrigado y en reposo. **En caso de ingestión:** no administrar agua ni provocar vómitos, debido a un riesgo de complicaciones pulmonares. Trasladar al afectado al servicio hospitalario más cercano, en lo posible llevando la etiqueta o el envase del producto. En todos los casos trasladar en forma inmediata a un centro asistencial.

Síntomas de Intoxicación: irritación de la piel y ojos, irritación de las vías respiratorias, cefalea, confusión mental, irritación gastrointestinal, vómitos, diarrea, vértigo, letargo, pasividad y ataxia.

<<EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA); (2) 24869000 (ANASAC)

<<NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve **TANGO 24 EC** en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave.

No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes o semillas.

Nota al comprador:

A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

CUIDADO



TANGO 24 EC, es un herbicida que controla un amplio espectro de malezas de hoja ancha y gramíneas mencionadas en el cuadro de instrucciones de uso.

Instrucciones de Uso:

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES	CARENCIA (días)
CEBOLLA DE TRANSPLANTE	Arvejilla Ballica Bledo Bolsita del pastor Chamico Enredadera Duraznillo Hualcacho Malva Manzanilla Ñilhue Ortiga muerta Pacoyuyo Pata de gallina Poa o Pojillo Pichoga Quinguilla Quiloy-Quiloy Pega-pega Rábano Romaza Senecio (<i>Senecio vulgaris</i>) Verdolaga Yuyo (<i>Brassica rapa</i>)	1 - 1.5	Aplicar de pre-transplante después de melgar. Aplicar después del transplante 1.5 L/ha a los 15 días y 1.0 L/ha a los 40 días. Aplicar con malezas de 3-4 cm de altura o 2 hojas verdaderas y volumen de agua 400 L/ha. En post-transplante Tango 24 EC 0.3-0.6 L/ha repetidamente.	45
CEBOLLA DE SIEMBRA DIRECTA		1 - 1.5	Aplicar de postemergencia temprana de las malezas sobre suelo húmedo y con plantas de 4 hojas verdaderas. Mojamiento 300-400 L/ha	60
CEBOLLA PICKLERA Y AJO		1 - 1.5	Aplicar en postemergencia, con suelo húmedo sobre malezas que tengan 1 a 2 hojas verdaderas y Cultivo con 2 a 3 hojas como mínimo o con 8 a 10 cm de altura. Repetir con reinfestación de malezas. Mojamiento de 400 L/ha.	60
BROCOLI, REPOLLO, COLIFLOR, ALCACHOFA		2 - 3	Aplicar en pre-emergencia o post-emergencia temprana de las malezas. No aplicar sobre el cultivo después del transplante. Aplicar sobre suelo bien nivelado, melgado y húmedo 1 a 2 días antes del transplante. Mojamiento 300-400 L/ha	No corresponde
LECHUGA, ESPINACA		0.5	Aplicar en pre-emergencia de las malezas antes de la siembra o transplante, con suelo melgado y bien húmedo. No se debe aplicar en post-emergencia del cultivo. Mojamiento 300-400 L/ha	No corresponde
VID, MANZANO, PERAL, KIWI, PALTO, ALMENDRO, DURAZNERO, NECTARINO, CIRUELO, CEREZO, DAMASCO, NOGAL, OLIVO, ARANDANO, FRAMBUESO, CRANBERRIE, NARANJO, POMELO, MANDARINO		3 - 4	Aplicar en invierno sobre suelo mullido y húmedo en pre y/o postemergencia temprana de las malezas. Aplicar solo hasta 15 días antes de brotación. Siempre aplicar alrededor del tronco y dirigido a las malezas. No aplicar con árboles en brotación. Aplicar sólo en vides mayores de 3 años y kiwi y frambuesa mayores a 1 año. Se puede inyectar en el sistema de riego tecnificado, en ese caso, es necesario calcular la dosis en función de la superficie efectivamente tratada. Importante que la fuente de inyección esté cerca del área a tratar. Mojamiento 200-300 L/ha	No corresponde
VIVEROS FORESTALES PINOS		2	Aplicar en pinos después de la siembra, en preemergencia de las plantas, o bien, en post emergencia después de 5 semanas de emergidas, esto debido a que TANGO 24 EC es fitotóxico en plantas de Pino recién emergidas.	No corresponde
EUCALIPTUS		1 - 1.5	Aplicar en eucaliptus en postemergencia, con plantas sobre 5 cm de altura. Mojamiento de 200 a 400 L/ha.	No corresponde
PLANTACIONES FORESTALES DE PINO Y EUCALIPTUS		3 - 4	Aplicar en invierno en forma dirigida después del transplante, sobre suelo sin malezas o recién emergidas. En aplicaciones postemergentes, cuidar de no tocar las plantas del cultivo. Usar dosis medias en el control únicamente de gramíneas, con un mojamiento de 150 a 300 L/ha.	No corresponde

Observaciones:

- No realizar labores después de la aplicación. Al remover el suelo se destruye la actividad herbicida.
- Lluvias o riegos por aspersión posteriores a una aplicación pueden afectar por salpicado de producto desde el suelo a las partes bajas o tiernas del cultivo o plantas nuevas.
- En cultivos hortícolas establecidos aplicar dirigido a la maleza, procurando no mojar el cultivo.
- No se debe aplicar en cultivos de cebolla de siembra directa o ajo de semilla
- No aplicar para controlar malezas de reproducción vegetativa,
- Generalmente se aplica una vez por temporada de cultivo, sin embargo, es factible repetir el tratamiento cada vez que exista una nueva emergencia de malezas desde el suelo.
- Se aplica por aspersión al suelo para el control pre y post emergente de las malezas, usando agua como carrier.
- Realizar como máximo 15 aplicaciones por temporada
- Usar dosis menor con malezas en sus primeros estados de desarrollo, estado de cotiledón, y dosis mayor con malezas más desarrolladas, primeras hojas verdaderas.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque del equipo aplicador con la mitad del agua que va a utilizar, agregar la dosis deseada de **TANGO 24 EC**, luego completar con agua hasta el volumen requerido, manteniendo agitación constante.

Incompatibilidad: **TANGO 24 EC**, es compatible con la mayoría de los herbicidas de uso corriente como Paraquat, Rango 480 SL, Simazina.

Fitotoxicidad: No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

Tiempo de reingreso: 24 horas para ingresar al sector tratado para personas y animales.

CUIDADO

