

KORALEN® 10%

Ketoprofeno 10%

AINE – Solución Inyectable

Reg. SAG N° 1716

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene:

Ketoprofeno 10 g
Excipientes c.s.p. 100 mL

ESPECIES DE DESTINO

Caballos, Bovinos y Cerdos.

INDICACIONES DE USO

Tratamiento de condiciones inflamatorias y dolorosas de los huesos y articulaciones, y sistema músculo esquelético en caballos y bovinos. Tratamiento sintomático del cólico en caballos. Adyuvante a la terapia antibiótica, en el tratamiento de condiciones inflamatorias, dolorosas y febriles del sistema respiratorio y glándula mamaria en bovinos y cerdos.

DOSIFICACIÓN Y VIA DE ADMINISTRACIÓN

Dosificación:

Caballos: Vía endovenosa: 2 - 3 mg de ketoprofeno por kg de peso corporal/día (equivalente a 1 mL de Koralen® 10% por cada 45 kg de peso corporal/día), durante 3 a 5 días consecutivos.

Bovinos: Vía endovenosa o intramuscular: 3 mg de ketoprofeno por kg de peso corporal/día (equivalente a 3 mL de Koralen® 10% por cada 100 kg de peso corporal/día), hasta por 3 días consecutivos.

Cerdos: Vía intramuscular: 3 mg de ketoprofeno por kg de peso corporal/día (equivalente a 3 mL de Koralen® 10% por cada 100 kg de peso corporal/día), durante 1 a 3 días consecutivos.

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

Mantener fuera del alcance de los niños

No usar en casos de hipersensibilidad a ketoprofeno, antecedentes de úlceras gastrointestinales, en casos de enfermedad hepática y renal severa. No administrar en hembras gestantes.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

PERIODO DE RESGUARDO

Bovinos y Cerdos: Carne, 4 días.

Caballos: No administrar en animales destinados a consumo humano.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO

PRESENTACIÓN

Frascos de 50 y 100 mL.

