

EHLIGLUMINA®

Flunixin meglumina 8,3%

AINE – Solución Inyectable

Reg. SAG N° 2102

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contiene:

Flunixin meglumina (equivalente a 5 g Flunixin base)	8,3 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

ESPECIES DE DESTINO

Caballos y Cerdos.

INDICACIONES DE USO

Caballos: Indicado para el tratamiento de la inflamación y el dolor en alteraciones músculo esqueléticas, y dolores viscerales asociados a cólicos.

Cerdos: Indicado en el Síndrome MMA (Metritis, Mastitis, Agalactia).

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Caballos: 1,1 mg de flunixin meglumina/kg de peso/día (equivalente a 1 mL de Ehliglumina®/45 kg de peso/día), hasta por 5 días, por vía endovenosa o intramuscular. Para cólicos, emplear la ruta endovenosa y puede repetirse cuando sea necesario.

Cerdos: 2,2 mg de flunixin meglumina/kg de peso/día (equivalente a 2 mL de Ehliglumina®/45 kg de peso/día), como dosis única o repitiendo la dosis a las 12 horas. Aplicar en la musculatura del cuello.

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

Mantener fuera del alcance de los niños

Hipersensibilidad a Flunixin meglumina.

No utilizar en casos de sangramiento gastrointestinal o úlceras, enfermedad renal, hepática o hematológica.

No usar en hembras gestantes.

No usar en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

PERIODO DE RESGUARDO

Cerdos: 12 días.

Caballos: No destinar a consumo humano.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria

USO VETERINARIO

PRESENTACIÓN

Frascos de 20, 50 y 100 mL.

