

FICHA TÉCNICA

GORBAN® 24%
Sulfadoxina 200 mg – Trimetoprima 40 mg
Solución inyectable

Composición:

Cada ml de solución contiene:

Sulfadoxina	200 mg
Timetoprima	40 mg
Excipientes c.s.p.	1 ml

Indicaciones de uso:

Para el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por bacterias sensibles a Sulfadoxina/Trimetoprima, como infecciones primarias y secundarias del tracto respiratorio, gastrointestinal, urinario, genital, piel y articulaciones.

La actividad *in vitro* ha sido demostrada con organismos comunes Gram negativos y Gram positivos incluyendo *Staphylococcus aureus*, *Pasteurella multocida*, *Escherichia coli*, *Proteus mirabilis*, *Proteus vulgaris* y *Klebsiella aerogenes*.

Especies de destino:

Bovinos, caballos, ovinos, cerdos y perros.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

Dosis:

3 ml/50 kg de peso (equivalente a 12 mg/Kg de Sulfadoxina y 2,4 mg/Kg de Trimetoprima) en dosis única. Si el efecto terapéutico no se alcanza a las 24 horas, se puede repetir el tratamiento 48 horas después de administrada la primera dosis.

Vías de administración:

Bovinos, caballos, ovejas, perros : IV lenta o IM.
Cerdos : SC o IM.

Contraindicaciones:

Disfunciones severas del hígado y riñones.
Deterioro del sistema sanguíneo.
Hipersensibilidad hacia sulfonamidas.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Con el objeto de prevenir el deterioramiento de los riñones por cristaluria durante el tratamiento se recomienda dar suficientes líquidos.

No usar en animales con conocida sensibilidad hacia la sulfonamida. Las inyecciones intravenosas deben estar a temperatura ambiente y deben ser administradas lentamente con el objeto de evitar

FICHA TÉCNICA

shock anafiláctico. Si observa intolerancia inmediata, interrumpa la inyección y comience un tratamiento de choque.

El uso intravenoso concurrente de sulfonamidas con α -2-agonistas ha dado como reporte arritmias cardíacas que pueden llegar a ser fatales, por lo tanto, está recomendado que no se debe administrar Gorban en forma intravenosa a caballos sedados con α -2-agonistas.

En cuanto a la formulación trimetoprima sulfonamida, la posibilidad de daño en los riñones, hígado o sistema sanguíneo debe ser considerada.

Bastante agua potable debe ser suministrada durante el tratamiento con Gorban.

Enfermedades debidas a *Streptococcus faecalis*, *Pseudomonas spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae* y *Leptospiras spp.* pueden ser total o parcialmente resistentes al medicamento con sulfadoxina/trimetoprima.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No se conocer reacciones de sobredosis.

Efectos no deseados o reacciones adversas:

Luego de la aplicación intramuscular o subcutánea podrían aparecer las siguientes reacciones locales:

- Estados de shock cardíacos y respiratorios en caballos han sido observados mayoritariamente luego de aplicación intravenosa. Por lo tanto, se deberá administrar vía intravenosa sólo en casos con justificación terapéutica.
- La solución de la inyección debe ser aplicada a la temperatura del cuerpo. En los primeros síntomas de intolerancia, la inyección debe ser interrumpida e iniciar tratamiento de choque. El producto debe ser inyectado lentamente por un período razonablemente práctico.
- La ruta intravenosa de aplicación está contraindicada en el caso de administración previa o concurrente de relajadores del sistema nervioso central (como por ejemplo, anestésicos o neurolépticos).
- La posibilidad de una reacción anafiláctica o de hipersensibilidad ocurrida luego de la aplicación deberá ser tomada en consideración.
- Como en todas las fórmulas de sulfonamidas y trimetoprima las posibilidades de un daño potencial a los riñones, hígado y sistema sanguíneo deben ser considerados.

Período de resguardo:

Carne: 10 días.

Leche: 4 días.

Precauciones especiales para el operador:

Ninguna.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar a temperatura ambiente, protegido de la luz a una temperatura entre 15° y 30°C.

FICHA TÉCNICA

Presentación:

Estuche conteniendo un frasco con 10, 50, 100 o 250 ml de producto.

Fabricado por:

Intervet International GmbH.
Feldstraße 1 a, 85716 Unterschleißheim,
Alemania.

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile.
Bajo Licencia de Intervet International B.V., Holanda

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA.

Reg SAG N°1008