

AMPLIFORT®

Ampicilina 75 mg / Cloxacilina 200 mg

Antibióticos – Suspensión Intramamaria

Reg. SAG N° 0736 - B

COMPOSICIÓN

Cada jeringa (1 dosis) contiene:	
Ampicilina sódica (Equivalente a 75 mg Ampicilina base)	80 mg
Cloxacilina sódica (Equivalente a 200 mg Cloxacilina base)	210 mg
Excipientes c.s.p.	1 jeringa

ESPECIES DE DESTINO

Bovinos (Vacas lecheras).

INDICACIONES DE USO

Terapia clínica de las mastitis bacterianas producidas en bovinos por gérmenes sensibles a la Ampicilina y Cloxacilina, como bacterias Gram + y Gram -, según antibiograma.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dosificación:

Bovinos: 75 mg de Ampicilina + 200 mg de Cloxacilina por cuarto (equivalente a 1 jeringa por cuarto) cada 12 horas.

El tratamiento completo incluye 3 dosis.

Vía de administración: Intramamaria.

PERIODO DE RESGUARDO

Carne: 7 días.

Leche: 60 horas.

CONTRAINDICACIONES, PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO Y ADVERTENCIAS

No administrar a animales con historia de hipersensibilidad a las Penicilinas.

Animales con historial conocido de alergia a las Cefalosporinas deben ser tratados con especial atención.

Los animales deben ser tratados al detectarse los primeros signos de mastitis, siempre durante el periodo de lactación.

Después de la ordeña a fondo antes de aplicar el producto, el cuarto debe ser lavado con una solución antiséptica.

Tras aplicar el producto, dar un masaje a la ubre a fin de mejorar la distribución de la suspensión.

Mantener fuera del alcance de los niños

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar en lugar fresco, entre 15 y 30 °C, y al abrigo de la luz. No congelar.

PRESENTACIÓN

Caja con 4 o 12 Jeringas de 10 mL y Balde con 48 Jeringas de 10 mL.

USO VETERINARIO

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.



FT0142NAC29082019R1V1

