

LIDOCALM[®] Solución Inyectable

ANESTÉSICO LOCAL.



Se indica como anestésico local por infiltración o bloqueo neural, para intervenciones tales como: castraciones, sutura de heridas, intervenciones oftálmicas, vulvoplastías, o cualquier intervención que requiera la suspensión temporal de la sensación de dolor. Se indica en el bloqueo perineural para el diagnóstico de cojeras; como anestésico paravertebral o raquídeo, para ruminotomías o cesáreas.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos, bovinos, ovinos, caprinos, cerdos, perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Anestésico local.

COMPOSICIÓN

Cada 1 mL de solución contiene:
Lidocaína Clorhidrato..... 20,0 mg
Excipientes c.s.p.....1 mL

INDICACIONES

Se indica como anestésico local por infiltración o bloqueo neural, para intervenciones tales como: castraciones, sutura de heridas, intervenciones oftálmicas, vulvoplastías, o cualquier intervención que requiera la suspensión temporal de la sensación de dolor. Se indica en el bloqueo perineural para el diagnóstico de cojeras; como anestésico paravertebral o raquídeo, para ruminotomías o cesáreas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración subcutánea, intramuscular y epidural en todas las especies.

Dosis del principio activo:	Anestesia local	Anestesia Epidural
Especie		
Caballos	Máximo 4 mg/Kg	0,2 mg/Kg
Bovinos	Máximo 4 mg/Kg	0,2 mg/Kg
Ovinos y Caprinos	Máximo 4 mg/Kg	4,4 mg/Kg
Cerdos	Máximo 4 mg/Kg	4,4 mg/Kg (máx 400 mg)
Perros	Máximo 8 mg/Kg	4,4 mg/Kg
Gatos	Máximo 4 mg/Kg	4,4 mg/Kg

Dosis del producto:	Anestesia local	Anestesia Epidural
Especie		
Caballos	Máximo 20 mL/100 Kg	1 mL/100 Kg
Bovinos	Máximo 20 mL/100 Kg	1 mL/100 Kg
Ovinos y Caprinos	Máximo 4 mL/20 Kg	1 mL/4,5 Kg
Cerdos	Máximo 4 mL/20 Kg	1 mL/4,5 Kg (máx 20 mL)
Perros	Máximo 4 mL/10 Kg	1 mL/4,5 Kg
Gatos	Máximo 0,2 mL/Kg	1 mL/4,5 Kg

CONTRAINDICACIONES

- No usar en animales con hipersensibilidad conocida a los anestésicos locales de la clase amidas.
- No administrar en hembras preñadas o en lactancia.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Advertencias y precauciones especiales de uso:

- La dosis requerida dependerá de la extensión de la región que se desea anestésiar, del tipo y magnitud de la intervención y de la especie.
- Usar con precaución en animales con disfunción hepática o cardíaca.
- Evitar una sobredosis del producto, puede provocar depresión de funciones neuromusculares y/o cardíacas.
- Los gatos tienden a ser más sensibles a los efectos de la droga sobre el sistema nervioso central, administrar con cautela.
- La toxicidad de la Lidocaína en el perro es potenciada con el Fenobarbital.
- Debe evitarse la inyección intravenosa accidental.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

- Evitar contacto con la piel. Lavarse las manos con agua y jabón después de manipular el producto.
- En caso de autoinyección accidental, busque atención médica de inmediato y muestre el folleto interno al médico.
- Las personas con hipersensibilidad conocida a la Lidocaína Clorhidrato deben evitar el contacto con el medicamento veterinario.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 28 días.

Leche: 7 días.

OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho:

Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original bien cerrado. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Disponer los desechos de este producto con precaución junto con los desechos domésticos.

CONSERVACIÓN

Almacenar entre 15 y 30°C, protegido de la luz. Utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar el producto sobrante.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 50 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG N° 1865

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario