XILA-10® - Solución Inyectable

SEDANTE-ANALGÉSICO.

Xila-10, solución inyectable, produce un estado de sedación acompañado de una relajación muscular general y una reducción de las sensaciones dolorosas. Por sus propiedades farmacológicas se indica en:

- Manejo y transporte de animales excesivamente nerviosos o agresivos.
- Procedimientos de diagnóstico.
- Procedimientos dentales.
- Cirugías menores de corta duración, tales como: limpieza y sutura de heridas, remoción de neoplasias dérmicas, etc.
- Procedimientos ortopédicos como despalme y herraje.
- Pre-anestesia en cirugías mayores o prolongadas, con anestésicos generales o locales.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos y bovinos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Sedante-Analgésico.

COMPOSICIÓN

Cada 1 mL de solución contiene:
Xilazina Clorhidrato.....117 mg
(equivalente a 100 mg de Xilazina base)
Excipientes c.s.p.....1 mL

INDICACIONES

Xila-10, solución inyectable, produce un estado de sedación acompañado de una relajación muscular general y una reducción de las sensaciones dolorosas. Por sus propiedades farmacológicas se indica en:

- Manejo y transporte de animales excesivamente nerviosos o agresivos.
- Procedimientos de diagnóstico.
- Procedimientos dentales.
- Cirugías menores de corta duración, tales como: limpieza y sutura de heridas, remoción de neoplasias dérmicas, etc.
- Procedimientos ortopédicos como despalme y herraje.
- Pre-anestesia en cirugías mayores o prolongadas, con anestésicos generales o locales.

MODO DE APLICACIÓN

La administración por vía endovenosa debe hacerse en forma lenta.
Luego de la inyección de Xila-10®, el animal se debe mantener en reposo hasta que se haya logrado el efecto deseado.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración por vía endovenosa lenta o intramuscular, en dosis única.

Dosis del principio activo:

- Caballos: 0,6 - 1,1 mg/Kg, por vía E.V. lenta
  2,2 - 3,0 mg/Kg, por vía I.M.
- Bovinos: 0,05 - 0,3 mg/Kg, por vía I.M.

Dosis del producto:

- Caballos: 0,6 - 1,1 mL/100 kilos, por vía intravenosa lenta
  2,2 - 3,0 mL/100 kilos, por vía I.M.
- Bovinos: 0,05 - 0,3 mL/100 kilos, por vía I.M.

Luego de la inyección de Xila-10, el animal se debe mantener en reposo hasta que se haya logrado el efecto deseado.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

La Xilazina no debe ser utilizada en terapéutica conjunta con neurolépticos o tranquilizantes. El uso de Xilazina y barbitúricos origina efectos depresores aditivos; la utilización de barbitúricos para inducir anestesia debe ser a un nivel reducido de dosis y administrado lentamente cuando se inyecte por vía endovenosa.
La Xilazina no debe ser utilizada en concomitancia con estimulantes de adrenoreceptores (Adrenalina, Noradrenalina, Dopamina).

CONTRAINDICACIONES

- No usar en concomitancia con estimulantes de adrenoreceptores (Adrenalina, Noradrenalina, Dopamina).
- No administrar a animales con arritmias ventriculares.
- No utilizar en animales que presenten cuadros intestinales de tipo obstructivo o de impactación intestinal.
- No administrar en hembras preñadas en el último tercio de gestación, excepto en el parto.
- No administrar en hembras en lactancia.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Advertencias y precauciones especiales de uso:

- Para lograr el efecto deseado, durante la administración del fármaco el animal debe estar tranquilo y en ayuno mínimo de 6 horas.
- Usar con precaución en animales con afecciones pulmonares, disfunción hepática o renal, enfermedad cardíaca severa, shock, o que se encuentren en condiciones de estrés, tales como calor o frío extremo, en altura, fatigados.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

- Lavarse las manos después de administrar el producto.
- Durante la manipulación del producto, no comer, beber líquidos, ni fumar.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- En el caso de existir contacto con los ojos se recomienda lavar con abundante agua por 15 minutos.
- En caso de ingestión accidental, llamar a un médico o a un centro de información toxicológica. No inducir el vómito.
- En caso de autoinyección accidental, consultar a un médico inmediatamente.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

EFECTOS ADVERSOS

- En caballos, en dosis terapéuticas ocasionalmente puede causar leve temblor muscular, bradicardia con bloqueo AV parcial y una disminución de la frecuencia respiratoria.
- En bovinos se puede presentar salivación profusa y atonía ruminal.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 2 días. No administrar a caballos cuya carne se destine a consumo humano.

Leche: 2 días.

OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho:
Disponer los desechos de este producto con precaución junto con los desechos domésticos. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

CONSERVACIÓN

Almacenar entre 15° y 30°C, protegido de la luz.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 50 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 1837
Rep. Dominicana: Reg. N° 9102

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario