

MOSKIMIC[®] FORTE - Solución Tópica

ANTIPARASITARIO *POUR ON*.



Moskimir[®] Forte es un antiparasitario externo que puede ser administrado a bovinos de cualquier edad en el control de la mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*).

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos.

DESCRIPCIÓN

Indicado para el control y eliminación de la mosca de los cuernos en bovinos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución tópica de uso externo
Pour-on

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario *pour on*.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene:

Permetrina10 g
Piperonil Butóxido.....30 g
Excipientes c.s.p.....100 mL

INDICACIONES

Moskimic® Forte es un antiparasitario externo que puede ser administrado a bovinos de cualquier edad en el control de la mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Aplicación tópica.

Dosis de los principios activos:

1 g de Permetrina y 3 g de Piperonil Butóxido por animal. Dosis única. Repetir el tratamiento a los 35 días.

Dosis del producto:

Aplicar 10 mL por animal. Dosis única. Repetir el tratamiento a los 35 días.

Con una pistola dosificadora o con jeringa, aplicar en una línea longitudinal dorsal desde la base de la cola (grupa) hasta la región de la cruz.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales con hipersensibilidad a alguno de los principios activos

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

- Aplicar con precaución en el ganado joven o debilitado
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

- No aplicar el producto próximo a fuentes de calor.
- Evitar el contacto con los ojos.
- La sobreexposición en sujetos susceptibles al producto, puede ocasionar efectos secundarios (alergias, rash cutáneo, otros).
- Al aplicar el producto, usar guantes.
- En caso de contacto accidental, lave la zona afectada con abundante agua y jabón.
- En caso de intoxicación consulte al médico

EFECTOS ADVERSOS

Las soluciones tópicas conteniendo Permetrina pueden causar irritación dérmica en los animales tratados.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 0 días.

Leche: 2 días.

OBSERVACIONES

Precauciones para eliminar el material de desecho:

- Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original.
- No arrojar el envase vacío o con restos de producto en ríos, lagos o torrentes de agua.
- No desechar el envase vacío o con restos de producto junto con los desechos domésticos.
- No reutilizar el envase.
- Disponer los desechos de este producto, en lo posible, con empresas que presten el servicio para eliminar desechos especiales.

CONSERVACIÓN

Almacenar en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30°C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Envase con 100 mL, 250 mL, 1 Litro y 3 Litros.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

- Chile: Reg. SAG N° 1370

- Rep. Dominicana: Reg. N° 7570

NOTA

Precauciones para eliminar el material de desecho:

- Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original.
- No arrojar el envase vacío o con restos de producto en ríos, lagos o torrentes de agua.
- No desechar el envase vacío o con restos de producto junto con los desechos domésticos.
- No reutilizar el envase.
- Disponer los desechos de este producto en lo posible con empresas que presten el servicio para eliminar desechos especiales.

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario