

EHLIQUANTEL®

Antiparasitarios - Comprimidos Orales

Reg. SAG N° 1337

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:

Praziquantel	50 mg
Pirantel pamoato	144 mg
Febantel	150 mg
Excipientes c.s.p.	1 Comprimido

ESPECIES DE DESTINO

Perros.

INDICACIONES DE USO

Indicado para el control y tratamiento de nematodos y tenias del perro. Dentro de los nematodos se indica su uso contra *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* y *Trichuris vulpis*. Dentro de las tenias se indica para el uso contra *Echinococcus granulosus*, *Dipylidium caninum* y *Taenia* spp.

DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Dosificación: La dosis a administrar es de 5 mg de Praziquantel/kg de peso corporal; 14,4 mg de Pirantel pamoato/kg de peso corporal y 15 mg de Febantel/kg de peso corporal, equivalente a 1 comprimido de Ehliquantel®/10 kg de peso corporal, como dosis única vía oral. En zonas con *Echinococcus granulosus*, repetir la dosis todos los meses mientras exista infestación positiva.

Vía de administración: Vía oral.

Modo de empleo:

Cachorros y perros de raza pequeña:

¼ comprimido para perros de 1 a 2 kg de peso corporal, lo que en promedio corresponde a 8,3 mg de Praziquantel, 24 mg de Pirantel pamoato y 25 mg de Febantel por cada kg de peso corporal.

½ comprimido para perros de 2 a 5 kg de peso corporal, lo que en promedio corresponde a 7 mg de Praziquantel, 20,6 mg de Pirantel pamoato y 21,4 mg de Febantel por cada kg de peso corporal.

1 comprimido para perros de 5 a 10 kg de peso corporal, lo que en promedio corresponde a 6,7 mg de Praziquantel, 19,2 mg de Pirantel pamoato y 20 mg de Febantel por cada kg de peso corporal.

Perros de raza mediana y grande:

1 comprimido por cada 10 kg de peso, lo que corresponde a 5 mg de Praziquantel, 14,4 mg de Pamoato de Pirantel y 15 mg de Febantel por cada kg de peso.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños.

No sobredosificar.

El uso de Pirantel no se recomienda en animales gravemente debilitados.

Se recomienda no utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar en hembras preñadas ni durante la lactancia.

No utilizar en cachorros menores de 3 semanas de edad y con un peso menor a 1 kg de peso corporal.

EFFECTOS NO DESEADOS Y REACCIONES ADVERSAS

Puede presentarse, con una baja probabilidad, signos como salivación, anorexia, letargia, vómitos o náuseas, y diarrea o heces blandas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15° y 30° C, en lugar seco y protegido de luz solar.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 50 sachets con un comprimido cada uno.

USO VETERINARIO - Venta bajo Receta Médico Veterinaria

