

TOVASIL® 10%

Antiparasitarios – Suspensión Oral

Reg. SAG N° 1800

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contiene:

Fenbendazol	10 g
Excipientes c.s.p.	100 mL



ESPECIES DE DESTINO

Bovinos, Ovinos, Caprinos y Caballos.

INDICACIONES

Antihelmíntico de amplio espectro, eficaz contra infestaciones por nematodos gastrointestinales y pulmonares en sus formas adultas y larvianas.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dosificación:

Bovinos: dosis única de 5 a 10 mg de Fenbendazol/kg de peso, equivalente a 5 y 10 mL de Tovasil® 10%/100 kg de peso, respectivamente.

Ovinos: dosis única de 5 mg de Fenbendazol/kg de peso, equivalente a 2,5 mL de Tovasil® 10%/50 kg de peso.

Caprinos: dosis única de 7,5 mg de Fenbendazol/kg de peso, equivalente a 3,8 mL de Tovasil® 10%/50 kg de peso.

Equinos: 7,5 mg de Fenbendazol/kg de peso, equivalente a 7,5 mL de Tovasil® 10%/100 kg de peso por 5 días consecutivos.

Vía de administración: Oral.

ADVERTENCIAS

Agitar bien antes de usar.

Mantener fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES

No se debe administrar a animales con hipersensibilidad conocida a la droga. No administrar a caballos destinados a consumo.

EFFECTOS NO DESEADOS O REACCIONES ADVERSAS

En las dosis de uso registradas, Fenbendazol no ocasiona reacciones adversas. Las reacciones de hipersensibilidad secundarias a la liberación de antígenos de los parásitos agonizantes pueden ocurrir, de manera particular con dosis elevadas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en lugar seco y protegido de la luz solar.

PERIODO DE RESGUARDO

Carne: 14 días.

Leche: 7 días.

PRESENTACIÓN

Envases de 250 mL, 1 L y 5 L.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria

USO VETERINARIO

FT0151NAC08062020R2V1

