

## FICHA TÉCNICA

### PANACUR® 10% Fenbendazol 100 mg Suspensión oral

#### Composición:

Cada 1 ml contiene:

Fenbendazol 100 mg  
Excipientes c.s.p. 1 mL

#### Indicaciones de uso:

Antihelmíntico de amplio espectro contra parásitos gastrointestinales y pulmonares, en fase de maduración sexual (vermicida), formas juveniles inmaduras y tardías (larvicida) y acción sobre los huevos. En perros tiene además una acción antiprotozoaria contra *Giardia*.

Bovinos: *Ostertagia spp.*, *Cooperia spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Nematodirus spp.*, *Haemonchus spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Bunostomum spp.* y *Dictyocaulus viviparus*. También es efectivo contra larvas inhibidas de *Ostertagia spp.*

Ovinos: *Ostertagia spp.*, *Haemonchus spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Nematodirus spp.*, *Cooperia spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *chabertia spp.*, *Bunostomum spp.*, *Dictyocaulus filaria*. También es efectivo contra la tenia de *Moniezia spp.* Y en algunas ocasiones contra *Trichuris spp.*

Caballos: Grandes Estrongilos (adultos y larvas migratorias de *S. vulgaris*, adultos y larva tisular de *S. edentatus*), pequeños Estrongilos inmaduros y adultos (*Cyathostomes*), *Oxyuris spp.*, *Strongyloides spp.*, *Parascaris equorum* y tiene efecto ovicida sobre huevos de nemátodos.

Perros: *Ancylostoma caninum*, *Toxocara canis* y *Giardia spp.*

#### Especies de destino:

Bovinos, ovinos, caballos y perros.

#### Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

Se aplica por vía oral mediante el empleo de un dispositivo (pistola dosificadora, botella, jeringa o sonda) el cual no se encuentra incluido en el producto.

#### Dosis:

Bovinos	5 mL por 100 kg de peso (5 mg/kg) en dosis única
Equinos	7,5 mL por 100 kg de peso (7,5 mg/kg) en dosis única
Ovinos	3,0 mL por 50 kg de peso (6 mg/kg) en dosis única
Perros	0,5 mL/kg de peso (50 mg/kg) en dosis única diaria por 3 días (control de nemátodos y <i>Giardia</i> )

#### Contraindicaciones:

No administrar conjuntamente con los derivados bromados de salicilanilida.

No usar en perros durante las etapas de gestación y lactancia.

## FICHA TÉCNICA

---

**Advertencias y precauciones especiales de uso:**

Agitar bien antes de usar.  
Mantener fuera del alcance de los niños.

**Interacciones con otros productos farmacéuticos:**

No administrar conjuntamente con los derivados bromados de salicilanilida.

**Efectos no deseados o reacciones adversas:**

No se han descrito.

**Período de resguardo:**

Bovinos: Carne: 11 días; Leche: 4 días.  
Ovinos: Carne: 12 días; Leche: 6 días.  
Caballos: No administrar a caballos destinados a consumo humano.

**Precauciones especiales para el operador:**

Ninguna.

**Condiciones de almacenamiento:**

Almacenar a temperatura ambiente entre 15° y 30°C.  
Utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar el producto sobrante.

**Presentaciones:**

Frascos multidosis de 100 mL, 250 mL, 1 L, 2,5 L y 5 L.

**Fabricado por:**

Merck Sharp & Dohme Saúde Animal Ltda.  
Coronel Bento Soares, 530 – Cruzeiro, Sao Paulo,  
Brasil

**Importado y distribuido por:**

Intervet Chile Ltda.  
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile.

**Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.**

**USO VETERINARIO**

**VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA**

**Reg SAG N°1006**