

EQUIMIC[®] Gel Oral

ANTIPARASITARIO INTERNO.



Antiparasitario interno de amplio espectro en dosis única; efectivo contra estados adultos, migratorios y/o larvarios de parásitos gastrointestinales tales como: *Strongylus vulgaris*, *Strongylus equinus*, *Strongylus edentatus*, *Oxyuris equi*, *Parascaris equorum*, pequeños estrógilos, *Strongyloides westeri*, *Trichostrongylus axei*, *Habronema spp.* y *Gasterophilus spp.*

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

DESCRIPCIÓN

Antiparasitario interno de amplio espectro para caballos

FORMA FARMACÉUTICA

Gel oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario interno.

COMPOSICIÓN

Cada 1 mL de gel contiene:
Ivermectina.....14,0 mg

Excipientes c.s.p.....1 mL

INDICACIONES

Antiparasitario interno de amplio espectro en dosis única; efectivo contra estados adultos, migratorios y/o larvarios de parásitos gastrointestinales tales como: *Strongylus vulgaris*, *Strongylus equinus*, *Strongylus edentatus*, *Oxyuris equi*, *Parascaris equorum*, pequeños estrógilos, *Strongyloides westeri*, *Trichostrongylus axei*, *Habronema spp.* y *Gasterophilus spp.*

MODO DE APLICACIÓN

- **Potrillos:** Iniciar el tratamiento entre las 6-8 semanas de edad, repitiendo el tratamiento a intervalos de 6 a 8 semanas.
- **Yeguas:** Se recomienda tratar 1 mes antes de la fecha de parto y repetir a los 60 días después del parto.
- **Caballos adultos:** Tratamiento cada 90 días. La repetición del tratamiento depende de la carga parasitaria y la estación del año.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía de administración: Oral.

Dosis del principio activo:

0,2 mg/Kg de peso en dosis única.

Dosis del producto:

1 mL/70 kilos de peso (0,2 mg/Kg), en dosis única.

Cada jeringa alcanza para 700 Kg de peso.

CONTRAINDICACIONES

- No usar en potrillos menores de 4 semanas de edad.
- No administrar a caballos con hipersensibilidad conocida a Ivermectina.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

- En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito. Consultar al médico lo más inmediatamente posible.
- En caso de contacto con la piel o con los ojos, lavar con abundante agua. Si se produce irritación, consultar al médico.

- Lavarse las manos después de la administración del producto.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.

EFFECTOS ADVERSOS

Se observan efectos adversos en un bajo porcentaje de animales a los cuales se les administra simultáneamente formulaciones orales e inyectables que contengan Ivermectina.

En casos de infestaciones graves se puede observar signos de cólicos transitorios.

PERÍODO DE RESGUARDO

No administrar en caballos cuya carne se destine a consumo humano.

OBSERVACIONES

Agradable sabor a manzana.

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho:

Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original. No arrojar el envase vacío o con restos de producto, en ríos, lagos o torrentes de agua. Disponer los desechos de este producto con precaución junto con los desechos domésticos.

CONSERVACIÓN

Conservar en un lugar fresco y seco, entre 15 y 30°C.

Utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar el producto sobrante.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Jeringa graduada con 10 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 1655-B

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario