

FICHA TÉCNICA

SOFOMAX®

Triclabendazol 10% – Abamectina 0,2%
Suspensión oral

Composición:

Cada 100 mL contiene:

Triclabendazol	10 g
Abamectina	0,2 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

Indicaciones de uso:

Antiparasitario interno y externo de amplio espectro, a base de Abamectina asociada con Triclabendazol, indicado en el combate contra vermes gastrointestinales, pulmonares y hepáticos de los bovinos, ovinos y caballos.

Bovinos:

- Nemátodos gastrointestinales: *Haemonchus placei*, *Ostertagia ostertagi* (inclusive larvas inhibidas), *Ostertagia lyrata*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus columbriformis* (inclusive larvas inhibidas), *Cooperia oncophora*, *Cooperia punctata*, *Nematodirus helvetianus*, *Bunostomum phlebotomum*, *Oesophagostomum radiatum*, *Trichuris ovis*.
- Nemátodos pulmonares: *Dictyocaulus viviparus*.
- Tremátodos: *Fasciola hepática* (formas inmaduras y adultas)

Ovinos:

- Nemátodos gastrointestinales: *Haemonchus placei*, *Haemonchus contortus*, *Ostertagia circumcincta*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus columbriformis*, *Cooperia curticei*, *Cooperia oncophora*, *Nematodirus spathiger*, *Strongyloides papillosus*, *Oesophagostomum columbianum*, *Oesophagostomum venulosum*, *Trichuris ovis*, *Chavertia ovina*.
- Nemátodos pulmonares: *Dictyocaulus filaria*.
- Larvas de los senos nasales y frontales: *Oestrus ovis*.
- Tremátodos: *Fasciola hepática*.

Caballos:

- Nemátodos gastrointestinales: *Parascaris equorum*, grandes y pequeños Estrongilos.
- Tremátodos: *Fasciola hepática*.

Especies de destino:

Bovinos, ovinos y caballos.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

Uso oral, dosis de 200 mcg/kg P.V. de Abamectina y 10 mg/kg P.V. de Triclabendazol, que corresponde a 1 ml del producto para 10 kg P.V. en dosis única, utilizando pistolas dosificadoras apropiadas.

FICHA TÉCNICA

Peso (kg)	Dosis (mL)	Peso (kg)	Dosis (mL)
10	1	100	10
20	2	200	20
30	3	300	30
40	4	400	40
50	5	500	50

Contraindicaciones:

No tratar animales convalecientes, debilitados o estresados.
No administrar en bovinos menores de 4 meses de edad.
No administrar el producto por vía inyectable.

Uso durante preñez y lactancia:

No utilizar el producto en hembras lactantes y gestantes.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Agitar bien antes de usar.
Mantener lejos del alcance de los niños.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No se conocen.

Efectos no deseados o reacciones adversas:

No se conocen.

Período de resguardo:

Carne: 49 días

No utilizar el producto en vacas y ovejas cuya leche se destine a consumo humano.

Precauciones especiales para el operador:

Evitar el contacto del producto con la piel y mucosas del cuerpo humano. En caso de contacto accidental, lavar repetidamente con agua y jabón.
No guardar junto con alimentos, bebidas, medicamentos, productos de higiene y domésticos, forrajes o alimentos para animales.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar en un lugar fresco y seco entre 15° y 30°C, protegido de la luz solar.

Presentación:

Envase multidosis de 100, 250 y 500 mL; 1, 2, 2,5, 5 y 200 L.

FICHA TÉCNICA

Fabricado por:

Merck Sharp & Dohme Saúde Animal Ltda.
Rua Coronel Bento Soares, 530 – Cruzeiro – SP, Brasil

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.
Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.

USO VETERINARIO
VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA
Reg SAG N°685-B