Drontal® Puppy

Desparasitante interno

Cachorros

Registro ICA No. 5173-DB	**Vida Útil:** 36 Meses	**Fabricante:** Bayer KVP Pharma - Alemania
Presentaciones de Venta: Caja x 1 frasco de 20 Ml		
Concepto Toxicológico: No Aplica	**Licencia Ambiental:** No Aplica	

Composición garantizada:	Composición garantizada: Cada 100 mL contiene: Pamoato de Pirantel (equivalente a 0,5 g de Pirantel base) ..... 1,44 g Febantel ..... 1,50 g Excipientes c.s.p. ..... 100 ml
Indicaciones:	Indicado en cachorros y perros jovenes para el tratamiento de infestaciónes ocacionadas: por: *Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinari stenocephala, Ancylosytoma caninum,Giardia sp, Ancylostoma braziliense y trichuris vulpis.*
Modo de empleo y dosis:	Verifique el peso del cachorro. El líquido puede ser meclazo con el alimento, con carne o directamente administrado depositándolo en el fondo de la boca del perro. Drontal Puppy es muy bien tolerado y puede ser administrado con el estomago lleno. **Dosis:** Administrar como dosis única 1 mL por kilogramo de peso del cachorro, o su equivalente a 15 mg de Febantel y 14,4 mg de Pirante. En caso de Giardiasis, administrar 2 días consecutivos. Agite antes de usar.
Recomendaciones:	En el caso de *Ancyostoma caninum,* cada adulto ingiere alrededor de 0,1 mL de sangre por día, por lo que infestaciones severas pueden ser fatales, sobre todo en los cachorros. Laa larvas de este parásito pasan por las gládula mamaria a la leche, penetran la piel sana del perro o el hombre o son ingeridas atravez del ambiente que se encuentra contaminado. El *Toxocara canis* infesta atravesando la glándula mamaria, atravesando la barrera transplacentaria o por ingestión de los huevos del medio ambiente. Las larvas de estos últimos parásitos pueden permanecer inactivas en la musculatura de la perra, produciendo infestaciones por varios partos consecutivos. Junto con la desparasitación debe realizarse una limpieza rigurosa del ambiente con productos a base de cloro, que es efectivo contra larvas y huevos de los parásitos.
Regimen de despacitación:	El programa de desparasitación recomendado por el Colegio Americano de Parasitólogos Veterinarios es el siguiente: Se inicia la desparasitación a los 15 días de edad, se continúa cada 15 días hasta los tres meses, luego una vez al mes a los 4, 5 y 6 meses, luego cada tres meses durante el resto de la vida del perro. Las hembras de cría se desparasitan antes de la cruza y al momento del parto, se pueden realizar desparasitaciones concomitantemente con los cachorros. Consulte a su Médico Veterinario para adecuar el tratamiento para cada caso particular.
Contraindicaciones:	Los estudios indican un amplio margen de seguridad, sin contraindicaciones o efectos colaterales. **Interacciones con otros medicamentos:** No se recomienda administración simultánea con Piperazina.
Amacenamiento.	Consérvese entre 5℃ y 30℃. Mantener fuera del alc ance de los niños.

Material de empaque:	Caja de cartón, con ambos extremos de cierre manual. Frasco plastico con tapa rosca de seguridad + una jeringa plastica transparente.

*Todas las marcas, avisos comerciales, diseños y demás signos distintivos son propiedad de BAYER, El uso no autorizado de los mismos queda prohibido expresamente y constituye una vulneración de los derechos de autor, derechos de marca y derechos de propiedad industrial.