

FICHA TÉCNICA
BRAVECTO®

 Fluralaner 112,5 mg – 250 mg – 500 mg – 1000 mg – 1400 mg
 Comprimidos masticables

Composición:

Cada comprimido masticable contiene:

	Bravecto® 112,5 mg	Bravecto® 250 mg	Bravecto® 500 mg	Bravecto® 1000 mg	Bravecto® 1400 mg
<u>Fluralaner (micronizado)</u>	112,5 mg	250 mg	500 mg	1000 mg	1400 mg
Excipientes c.s.p.	1 comprimido				

Indicaciones de uso:

Para el tratamiento y control de infestaciones por **garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus* adultas y juveniles)** y **pulgas (*Ctenocephalides felis* y *Ctenocephalides canis*)** en perros, proporcionando una actividad sistémica durante 12 semanas.

Las pulgas y garrapatas se deben fijar al huésped y comenzar a alimentarse con el fin de estar expuesta al principio activo. El inicio del efecto ocurre dentro de las 8 horas de la fijación de las pulgas (*C. felis*) y 12 horas de la fijación de las garrapatas.

El producto controla de forma efectiva las poblaciones de pulgas ambientales en áreas a las cuales los perros tratados tienen acceso. Se puede utilizar como parte de una estrategia de tratamiento para el control de la dermatitis alérgica a la picadura de pulga (DAPP).

Para el tratamiento de la **sarna demodéica generalizada de presentación adulta o juvenil** causada por ***Demodex spp.***

Para el tratamiento de **sarna sarcóptica** causada por ***Sarcoptes scabiei*** e infestaciones por ***Otodectes cynotis***.

Especies de destino:

Perros (>20-40 kg)

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:
Vía de administración

Para uso oral.

Dosis

Los comprimidos masticables se deben administrar de acuerdo con la siguiente tabla (correspondiente a una dosis de 25-56 mg de fluralaner/kg de peso corporal dentro de un rango de peso):

Peso corporal (kg) del perro	Número y concentración del comprimido a administrar				
	Bravecto® 112,5 mg	Bravecto® 250 mg	Bravecto® 500 mg	Bravecto® 1000 mg	Bravecto® 1400 mg
2 – 4,5	1				
>4,5 - 10		1			
>10 – 20			1		
>20 – 40				1	
>40 - 56					1



BRAVECTO®
Comprimidos masticables

FICHA TÉCNICA

Los comprimidos no se deben romper o dividir.

Para perros con un peso corporal superior a 56 kg, utilizar una combinación de dos comprimidos que coincidan lo más posible a su peso corporal.

Modo de empleo

Administrar el producto a la hora o cerca a la hora de comer.

Bravecto® es un comprimido masticable y es bien aceptado por la mayoría de los perros. Si el perro no acepta el comprimido voluntariamente, también se puede administrar con la comida o directamente en la boca. Se debe observar al perro durante la administración para confirmar que el comprimido se ingirió.

Esquema de tratamiento

Para un óptimo control de la infestación de pulgas y garrapatas, el producto se debe administrar en intervalos de 12 semanas.

Para el tratamiento de sarna demodécica causada por *Demodex spp.*, sarna sarcóptica causada por *Sarcoptes scabiei* e infestaciones por *Otodectes cynotis*, el producto se debe administrar en intervalos de 12 semanas.

Para la prevención de la infección por *Dypilidium caninum* desde pulgas infestadas, el producto se debe administrar en intervalos de 12 semanas.

Bravecto® se puede administrar todo el año.

Contraindicaciones:

No utilizar en caso de hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los excipientes.

En ausencia de datos disponibles, el producto no se debe utilizar en cachorros menores de 8 semanas de edad y/o perros que pesen menos de 2 kg.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Debido al rápido inicio de la acción acaricida e insecticida del producto, el riesgo de transmisión de enfermedades parasitarias se reduce sustancialmente por su uso. Sin embargo, los parásitos deben iniciar la alimentación en el huésped para estar expuestos al principio activo fluralaner, por lo que en caso que las condiciones sean desfavorables no se debe excluir el riesgo de transmisión de enfermedades parasitarias al nacimiento.

El producto no se debe administrar en intervalos más cortos a 8 semanas debido a que no se ha estudiado la seguridad para intervalos más cortos.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales reproductores:

Se puede utilizar durante la preñez, lactancia y en animales reproductores.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No se describen.

Efectos no deseados o reacciones adversas:

Casos aislados (1,6%) de síntomas gastrointestinales leves y transitorios tales como diarrea/ vómito/ inapetencia/ babeo, relacionados con la vía de administración del producto se observaron en estudios clínicos.



BRAVECTO®
Comprimidos masticables

FICHA TÉCNICA

Letargia, temblor muscular, ataxia y convulsiones han sido reportados muy raramente en reportes espontáneos. La mayoría de las reacciones adversas reportadas fueron autolimitadas y de corta duración.

Período de resguardo:

No aplica.

Precauciones especiales para el operador:

Mantener el producto en el empaque original hasta su uso, con el fin de prevenir que los niños tengan acceso directo al producto.

No comer, tomar bebidas o fumar mientras se manipula el producto.

Lavar las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30° C. Almacenar en un lugar seco y fresco, protegido de la luz.

Presentación:

Estuche conteniendo un blíster con 1, 2 o 4 comprimidos. Incluye inserto.

Fabricado por:

Intervet GesmbH
Siemensstraße 107
A-1210 Viena
Austria.

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

Reg. SAG N°: 2284 / 2285 / 2286 / 2283 / 2287