

# BOVIFORT® Solución Inyectable

---

ANTIPARASITARIO DE AMPLIO ESPECTRO - FASCIOLICIDA.



Bovifort® es un antiparasitario inyectable de amplio espectro que está indicado en el tratamiento de infestaciones por parásitos gastrointestinales, pulmonares y ectoparásitos en bovinos. Por su acción específica como fasciolicida, también se indica en el tratamiento de la distomatosis hepática, causada por *Fasciola hepatica* adulta, ejerciendo además un adecuado control sobre estados juveniles de 8 semanas o más. Su uso está indicado en el tratamiento y control de los principales parásitos internos y externos de bovinos como: *Ostertagia sp.*; *Haemonchus sp.*; *Trichostrongylus sp.*; *Cooperia sp.*; *Oesophagostomum radiatum*; *Nematodirus sp.*; *Dictyocaulus viviparus*; *Fasciola hepatica*; *Haematopinus eurytarnus*; *Linognathus vituli*;; *Psoroptes bovis*, *Sarcoptes scabiei var bovis*.

## Ficha Técnica

### ESPECIES

---

Bovinos.

### FORMA FARMACÉUTICA

---

Solución inyectable.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

---

Antiparasitario de amplio espectro - Fasciolicida.

### COMPOSICIÓN

---

Cada 1 mL de solución inyectable contiene:  
Ivermectina.....10 mg  
Clorsulón.....100 mg  
Excipientes c.s.p..... 1 mL

## INDICACIONES

---

Bovifort® es un antiparasitario inyectable de amplio espectro que está indicado en el tratamiento de infestaciones por parásitos gastrointestinales, pulmonares y ectoparásitos en bovinos. Por su acción específica como fasciolicida, también se indica en el tratamiento de la distomatosis hepática, causada por *Fasciola hepatica* adulta, ejerciendo además un adecuado control sobre estados juveniles de 8 semanas o más. Su uso está indicado en el tratamiento y control de los principales parásitos internos y externos de bovinos como: *Ostertagia sp.*; *Haemonchus sp.*; *Trichostrongylus sp.*; *Cooperia sp.*; *Oesophagostomum radiatum*; *Nematodirus sp.*; *Dictyocaulus viviparus*; *Fasciola hepatica*; *Haematopinus eurysternus*; *Linognathus vituli*;; *Psoroptes bovis*, *Sarcoptes scabiei var bovis*.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

---

### Vía de administración:

Subcutánea.

No aplicar el producto por vía endovenosa o intramuscular.

En algunos casos se puede presentar dolor leve en el sitio de inyección.

### Dosis de los principios activos:

Ivermectina: 0,2 mg/Kg y Clorsulón: 2 mg/Kg

Dosis única.

### Dosis del producto:

1 mL por cada 50 Kg de peso en dosis única..

## ADVERTENCIAS

---

Mantener fuera del alcance de los niños.

## PERÍODO DE RESGUARDO

---

**Bovinos de carne:** 49 días.

**Bovinos de leche:** No administrar a animales cuya leche se destine para consumo humano.

## CONSERVACIÓN

---

Mantener a temperatura ambiente entre 15° y 30° C, en un lugar seco y protegido de la luz.

#### CONDICIÓN DE VENTA

---

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

#### PRESENTACIÓN

---

Frasco ampolla con 50 mL y frasco tipo suero con 500 mL

#### ELABORADO POR

---

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

#### REGISTROS

---

Chile: Reg. SAG N° 1880-B

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario