

PEDEROL®

Clortetraciclina clorhidrato 2%

Antibióticos – Aerosol Tópico

REG. SAG N° 2070-B

COMPOSICIÓN

Cada g contiene:
Clortetraciclina clorhidrato 20 mg
(Equivalente a 18,6 mg de Clortetraciclina base)
Excipientes c.s.p. 1 g

ESPECIES DE DESTINO

Bovinos, Ovinos, Caprinos, Cerdos y Caballos.

INDICACIONES DE USO

Tratamiento de heridas quirúrgicas y superficiales. Coadyuvante en el tratamiento de la pododermatitis y otras infecciones podales causadas por gérmenes sensibles a Clortetraciclina.

DOSIFICACIÓN Y VÍA ADMINISTRACIÓN

Dosificación:

Previa limpieza de la zona a tratar y eliminación de los tejidos necrosados, pulverizar la zona afectada con el brazo extendido hasta cubrir ésta. Si dentro de 48 horas no existen resultados, suspender el tratamiento y consultar con el Médico Veterinario.

Vía de administración: Tópica.

ADVERTENCIAS:

Antes de la aplicación, limpiar la zona afectada, eliminando la suciedad y tejidos necrosados.

Agitar el spray antes de usarlo.

No aplicar sobre los ojos, ya que puede aparecer una irritación local.

Evitar el contacto o lamido de la zona afectada durante 5 minutos.

Evitar el contacto con el producto, especialmente su inhalación.

No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente.

Envase a presión. No exponerlo al sol ni a temperaturas superiores a 30 °C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales con historial de hipersensibilidad a las Tetraciclinas.

No administrar en periodo de gestación o lactancia.

EFFECTOS NO DESEADOS O REACCIONES ADVERSAS

Reacciones cutáneas locales.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar en lugar fresco, seco (entre 15 y 30 °C) y al abrigo de la luz.

PERIODO DE RESGUARDO

Carne y leche: Cero (0) días.

PRESENTACIÓN

Envases de 75 y 250 mL.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria

USO VETERINARIO



ANTIBIÓTICOS

FT0147NAC02092019R1V1

