

EQUS[®] Plus Crema

ANTIINFLAMATORIO ANALGÉSICO.



Recomendado para el tratamiento antiinflamatorio y analgésico a nivel de piel, tejido subcutáneo, músculo y articulaciones en caballos.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

FORMA FARMACÉUTICA

Crema.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiinflamatorio Analgésico.

COMPOSICIÓN

Cada 100 g de crema contiene:
Fenilbutazona.....5,0 g
Lidocaína.....2,0 g
Dimetilsulfóxido.....10,0 g
Excipientes c.s.p.....100 g

INDICACIONES

Recomendado para el tratamiento antiinflamatorio y analgésico a nivel de piel, tejido subcutáneo, músculo y articulaciones en caballos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía de administración tópica.

Modo de uso:

Limpie la piel en la zona a aplicar, luego aplique una cantidad suficiente de producto que permita dejar una capa delgada sobre la zona afectada, aplicar dos o tres veces al día masajeando suavemente. Use por un máximo de 14 días o según indicación del Médico Veterinario.

CONTRAINDICACIONES

- No administrar a animales con insuficiencia cardíaca, renal o hepática, deshidratados, o con anomalías hematológicas o de la médula ósea o que sean hipersensibles a los activos.
- No administrar a hembras preñadas ni en lactancia.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Advertencias y precauciones especiales de uso:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- El Dimetilsulfóxido puede producir irritación, eritema, vesículas, resequedad de la piel, o reacción alérgica local, que son transitorias y resuelven rápidamente cuando la terapia es descontinuada.
- Tanto la Fenilbutazona como el Dimetilsulfóxido pueden enmascarar una patología existente, debido a sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas.
- Usar con precaución en animales deshidratados o en animales con shock, debido a que el efecto diurético y vasodilatador del Dimetilsulfóxido puede exacerbar estas condiciones.
- En caballos de competencia usar con precaución por contenido de Lidocaína en su formulación.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

- Al aplicar el producto utilizar guantes protectores.
- Si existe contacto con piel, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, se recomienda lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos y en ingestión accidental enjuagar la boca con

abundante agua. No inducir el vómito a menos que sea indicado por un médico. Se recomienda acudir a un centro asistencial con prontitud.

PERÍODO DE RESGUARDO

No usar en animales destinados al consumo humano.

CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura ambiente entre 15° y 30°C, en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Pomo con 120 g

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

- Chile: Reg. SAG N° 0375
- Rep. Dominicana: Reg. N° 5599
- Panamá: Reg. N° RF-4130-18

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario