

TOPFLAM[®] Gel Tópico

ANTIINFLAMATORIO.



Topflam[®] está indicado para el control del dolor y la inflamación asociado al sistema músculo-esquelético.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

FORMA FARMACÉUTICA

Gel tópico.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiinflamatorio.

COMPOSICIÓN

Cada 100 g de producto contiene:
Diclofenaco Sódico.....1 g
Excipientes c.s.p.....100 g

INDICACIONES

Topflam® está indicado para el control del dolor y la inflamación asociado al sistema músculo-esquelético.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administrar vía tópica 7,3 g de gel o una banda de 13 cm de gel, dos veces al día por 5 días, equivalente a 73 mg de Diclofenaco Sódico en cada aplicación. Frotar la articulación a tratar con el producto hasta que éste se absorba completamente.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Se debe evitar el uso de otras drogas de aplicación tópica ya que pueden inhibir la absorción de Topflam® y causar irritación en la zona de aplicación. No se ha estudiado la administración concomitante de otros AINEs por vía sistémica.

CONTRAINDICACIONES

- No administrar en animales sensibles a la droga.
- No usar en conjunto con AINEs.
- No administrar durante la gestación ni lactancia.
- No administrar en potrillos menores de un año.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Exceder la dosis recomendada o tratar varias articulaciones a la vez en un mismo animal, puede incrementar las concentraciones plasmáticas de Diclofenaco.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

- Evitar el contacto con la piel, usar guantes para aplicar el producto. En el caso de contacto, lavar con agua y jabón.
- Evitar contacto accidental con los ojos. En el caso de contacto, enjuagar con abundante agua y consultar al Médico inmediatamente.
- No manipular por personas hipersensibles a Diclofenaco Sódico.
- En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar etiqueta del producto.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

PERÍODO DE RESGUARDO

No administrar a caballos cuya carne se destine a consumo humano.

OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho:

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30° C, protegido de la luz.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Pomo con 120 g

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 2042

Perú: Reg. SENASA F.C4.75.I.0010

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y Distribuido en Perú por Representaciones Durand SAC.
Av. Manuel Olgún N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico

Veterinario